

ASOCIÁCIA *FESTUCETUM CARPATICAE* DOMIN 1925 V KRIVÁNSKEJ MALEJ FATRE

Ivana Šibíková, Jozef Šibík, Ivan Jarolímek, Jana Uhlířová

Abstract: Association *Festucetum carpaticae* Domin 1925 in Krivánska Malá Fatra Mts. This article refers the results of phytocoenological research held in the Krivánska Malá Fatra Mts in the last years and focuses on one of the most species-rich plant community above the timberline, *Festucetum carpaticae*. The short synmorphological, syncological and synchrological characteristics are given, respecting the regional traits. Also the literary review is discussed.

Keywords: Krivánska Malá Fatra Mts, subalpine belt, *Festuca carpatica*, syntaxonomy, tall-grass communities

Úvod

Asociácia *Festucetum carpaticae* zahŕňa vysokotravinné porasty, ktoré patria k jedným z najbohatších nad hornou hranicou lesa v Západných Karpatoch. Napriek ich atraktivite bolo z Krivánskej Malej Fatry (KMF) donedávna publikovaných len zopár fytocenologických zápisov (cf. Milová, Urbanová 1989, Urbanová 1991 a neskôr Šibík et al. 2004). Jedným z cieľov vegetačného výskumu na území KMF v posledných rokoch bolo prispieť k poznaniu tohto spoločenstva a doplniť informácie o jeho rozšírení a regionálnych špecifikách. Jeho výsledky sú prezentované v nasledujúcom príspevku, ktorý nadväzuje na podobné práce (cf. Šibík et al. 2004, Krajčiová-Šibíková et al. 2005, Šibíková et al. 2007, Šibíková et al. 2008a, b), zaoberajúce sa flórou a vegetáciou KMF.

Metodika

Práca vychádza zo spracovania fytocenologického materiálu získaného počas terénneho výskumu v KMF v rokoch 2002 – 2005 (cf. Šibíková 2006). Súbor 209 fytocenologických zápisov bol spracovaný numerickými klasifikačnými a ordinačnými metódami a na základe vyhodnotenia výsledkov boli určené regionálne diagnostické taxóny pre jednotlivé spoločenstvá. Predkladané výsledky predstavujú súčasť diplomovej práce Šibíková (2006).

Zápis bol získaný v súlade s metódami zurišsko-montpellierskej školy (Braun-Blanquet 1964; Westhoff, van den Maarel 1978). Použili sme upravenú 7-člennú Braun-Blanquetovu stupnicu abundancie a dominancie, rozšírenú o stupne 2m, 2a a 2b (Barkman et al. 1964). Pred samotným syntetickým spracovaním boli záписy uložené v databázovom programe TURBOVEG (Hennekens, Schaminée 2001).

Numerickú klasifikáciu sme robili v programe PC-ORD (McCune, Mefford 1999). Použili sme Wardovu metódu zhlukovania a ako koeficient podobnosti euklidovskú vzdialenosť. Aby sa zmenšil rozdiel medzi blízkymi hodnotami pri vyšších absolútynych

hodnotách pokryvnosti (cf. Lepš, Šmilauer 2000, Herben, Münzbergová 2003), boli dátá pri numerickej klasifikácii transformované druhou odmocinou (square root transformation). Tabuľka bola generovaná v programe JUICE (Tichý 2002) a finálne upravená v programe Microsoft Word; je totožná s tabuľkou 10 v diplomovej práci Šibíková (2006). Pri numerickom spracovaní boli použité aj 2 zápisy z práce Milová, Urbanová (1989), 1 zápis z práce Urbanová (1991) a 14 zápisov z rukopisu Bělohlávková (1980), ktoré však vo výslednej tabuľke prezentované nie sú. Diagnostické druhy nami definované majú len regionálnu platnosť, napokoľko odrážajú výsledky analýzy dát iba z územia Krivánskej Maléj Fatry (cf. Šibíková 2006). Sú to taxóny, ktoré vykazujú najväčšiu verność k jednotlivým asociáciám v rámci použitych dát z triedy *Mulgedio-Aconitea* (cf. Šibíková et al. 2006, Šibíková et al. 2008c). V súlade s výsledkami numerickej analýzy vysokobylinných a vysokosteblových spoločenstiev KMF (cf. Šibíková 2006, Šibíková et al. 2008c) rozlišujeme taxóny diagnostické (hodnota fidelity $\geq 0,300$), konštantne sprievodné (stálosť v jednotlivých asociáciach $\geq 60\%$) a dominantné (pokryvnosť v aspoň 1 zápise $> 50\%$). Vyčlenenie diagnostických taxónov pre jednotlivé spoločenstvá z územia KMF je diskutované a porovnávané s výsledkami rozsiahlej syntaxonomickej revízie vysokohorských spoločenstiev z územia Západných Karpát (Kliment et al. 2004, 2007).

Hodnoty pH sme zisťovali podľa práce Hraško et al. (1962). Geologický podklad bol určený podľa regionálnych geologických map Slovenska (Haško, Polák 1980).

Nomenklatúra taxónov je zjednotená podľa Zoznamu nižších a vyšších rastlín Slovenska (Marhold, Hindák 1998). Poddruhy (bez uvedenia mena druhu) sú v tabuľkách a v texte označené hviezdičkou. Mená syntaxónov sú podľa práce Kliment, Valachovič (2007). V teste a v tabuľke sme použili nasledovné skratky: agg. = agregát, cf. = porovnaj, D = dominantný taxón, I = diagnostický taxón, K = konštantne sprievodný taxón, sp. div. = rôzne druhy, z. = zápis. V lokalitách sú mená autorov zápisov skrátené nasledovne: IJ = I. Jarolímek, JK = J. Kliment, IS = I. Šibíková, JS = J. Šibík, ZD = Z. Dúbravcová.

Stručný literárny prehľad

Medzi prvé zmienky o asociácii *Festucetum carpatica* patrí práca, v ktorej ju Domin (1925) charakterizoval ako fyziognomicky a ekologicky veľmi dobre definované spoločenstvo, s charakteristickým floristickým zložením.

Pawlowski, Stecki (1927) ho zaznamenali na spevnených vápencových sutiach vo vlhkých, miestami strmých žlaboch pod skalnými stenami. Považujú ho za bezpochyby jedno z druhovo najbohatších rastlinných spoločenstiev Tatier. Jeho výskyt udávajú od 1 200 až do 2 050 m n. m. Z Kościelskej doliny na poľskej strane Západných Tatier ho uvádzajú aj Szafer et al. (1927). V Doline Siedmich prameňov zaznamenali druhovo bohaté spoločenstvo, v ktorom má *Festuca carpatica* svoje optimum, aj Hadač (1969) a Hadač et al. (1967, 1969).

Z masívu Sivého vrchu charakterizovali asociáciu *Festucetum carpatica* Dúbravcová, Hajdúk (1986) ako plošne málo rozšírené chionofilné a hygrofilné spoločenstvo, vyskytujúce sa v terénnych depresiách a hlboko zarezaných žlaboch, kde sa v zime akumuluje vysoká vrstva snehu. Dúbravcová et al. (1980) zaznamenali málo rozšírené a floristicky veľmi bohaté porasty s *Festuca carpatica* vo vápencových a dolomitových obvodoch Západných Tatier.

Unar et al. (1984, 1985) opisovali toto endemické spoločenstvo Západných Karpát ako neuzavreté, plošne nevelké a rôzne vyvinuté fytocenózy, do ktorých môžu prenikať druhy

zo susedných spoločenstiev a vo svojom ďalšom vývoji by mohli postupne zarastať koso-drevinou. Už aj Sillinger (1933) poukázal na dynamický vzťah asociácie s porastami koso-dreviny. Podľa ďalších autorov (Hadač et al. 1969, Milová, Urbanová 1989) toto floristicky bohaté spoločenstvo nadväzuje a vzájomne sa prelíná s porastami so *Sesleria tatrae* a *Carex *tatrorum*, spomínaná je aj úzka spätosť so spoločenstvami s *Calamagrostis arundinacea* (Hadač et al. 1969). Na vlhčích miestach vykazuje vzťahy k asociácii *Adenostyletum alliariae* (Šmarda et al. 1971). Hadač (1956) zaznamenal v Temnosmrečinovej doline vo Vysokých Tatrách spoločenstvo *Festucetum carpatica*, ktoré bolo floristicky velmi bohaté a rozšírené v najteplejšej časti doliny.

Zaradenie študovaného spoločenstva do vyšších syntaxonomických jednotiek bolo vždy problematické a nejednotné (cf. Pawłowski et al. 1928, Braun-Blanquet 1930, Sillinger 1932, Hadač et al. 1969). Aj z toho dôvodu bol v 80-tych rokoch vyčlenený samostatný zväz *Festucion carpatica* (Bělohlávková, Fišerová 1989). Opodstatnenosť a správnosť tohto kroku potvrdili na základe rozsiahlej syntaxonomickej revízie aj Kliment et al. (2004).

Charakteristika a zaradenie spoločenstva z územia Krivánskej Malej Fatry

Mulgedio-Aconitetea Hadač et Klika in Klika 1948

Vysokobylinné spoločenstvá vlhkých až mokrých nív v horskom až alpínskom stupni

Calamagrostietalia villosae Pawłowski et al. 1928

Vysokosteblové spoločenstvá horských nív v subalpínskom a alpínskom stupni

***Festucion carpatica* Bělohlávková et Fišerová 1989**

Vysokosteblové snehomilné spoločenstvá vo vlhkých skalnatých žľaboch na karbonátoch vo vyššom horskom až alpínskom stupni

FESTUCETUM CARPATICAE DOMIN 1925

Diagnostická skupina taxónov

Diagnostické taxóny: *Astrantia major*², *Bartsia alpina*¹, *Bellidiastrum michelii*, *Biscutella laevigata*, *Carex *tatrorum*, *Cortusa matthioli*³, *Crepis mollis*, *Festuca carpatica*¹, *Galium anisophyllum*, *Knautia arvensis* agg., *Lotus corniculatus*, *Phyteuma orbiculare*, *Primula elatior*², *Scabiosa lucida*, *Sesleria tatrae*³, *Soldanella carpatica*, *Swertia *alpestris*, *Tithymalus amygdaloïdes*, *Valeriana tripteris*

Konštantne sprievodné taxóny: *Achillea *alpestris*, *Alchemilla* sp. div.², *Campanula serrata*, *Geranium sylvaticum*², *Geum rivale*, *Heracleum sphondylium*², *Hypericum maculatum*², *Luzula sylvatica*³

Dominantné taxóny: *Calamagrostis varia*, *Carex *flacca*, *Dactylis *slovenica*, *Festuca carpatica*

Vysokosteblové, dvojvrstvové rastlinné spoločenstvo, ktoré patrí k druhovo najbo-

¹ druhy, ktoré Kliment et al. (2007) definovali ako charakteristické taxóny asociácie

² druhy, ktoré Kliment et al. (2007) definovali ako konštantne sprievodné taxóny asociácie

³ druhy, ktoré Kliment et al. (2007) definovali ako diferenciálne taxóny zväzu *Festucion carpatica*

hatším nad hornou hranicou lesa (priemerný počet druhov vyšších rastlín v zápisе je 38). Charakteristický vzhľad určuje dominantná kostrava karpatská (*Festuca carpatica*). Porasty asociácie *Festucetum carpaticae* bývajú zväčša husté, zapojené, s množstvom stariny na povrchu pôdy, čo je jeden z hlavných dôvodov zriedkavého výskytu machorastov v podraste. Prízemné poschodie býva lepšie vyvinuté v mladších vývojových štadiách fytocenóz, ktoré ešte nie sú celkom zapojené. Hlavnú vrstvu porastov vytvárajú okrem dominanty predovšetkým druhy *Bistorta major*, *Geum rivale*, *Hypericum maculatum* a *Valeriana tripteris*, často je zreteľná druhá, nižšia vrstva, tvorená prevažne taxónmi vlhkomilnými ako napr. *Alchemilla* sp. div., *Viola biflora*, *Primula elatior*, ako aj *Soldanella carpatica* či *Cortusa matthioli*. Druh *Pimpinella major*, ktorý je v typických fytocenózach Západných Karpát konštantne sprievodným taxónom (cf. Kliment et al. 2007), sa v zaznamenaných porastoch vyskytuje s nižšou stálosťou.

Ekologicky sú tieto porasty viazané na spevnené vápencové sutinové pôdy, prevažne typu rendziny. Vyskytujú sa zväčša na severne orientovaných svahoch, v zatielených, skalnými stenami chránených depresiách, lavínových dráhach, prípadne v enklávach v porastoch kosodreviny. Počas vegetačnej sezóny sú hojne zavlažované periodicky stejkajúcou dažďovou vodou, čo ale zároveň zabraňuje väčšej kumulácií humusových častí v pôde. Snehová pokrývka býva na týchto typoch stanovišť relativne hlboká a dlhotrvajúca, nie je výnimocné jej pretrvávanie až do mája (cf. Bělohlávková 1980). Priemerný sklon študovaných plôch je 33° (5 – 50°), rozpätie nadmorskej výšky 1 270 – 1 687 m n. m.


Bělohlávková (1980) zaznamenala výskyt spoločenstva na severných svahoch hrebeňa medzi Suchým a Koniarkami, Veľkého Rozsutca a fragmentárne na Stohu. Udáva, že je možné nájsť malé ostrovčeky dominanty aj v iných častiach pohoria, nevytvárajú však spoločenstvo ako také. Výskyt asociácie pod sedlom Hromové zdokladoval fytocenologickým zápisom aj Šibík (2003). My sme okrem týchto lokalít zaznamenali fytocenologické zápis aj na svahoch Veľkého Kriváňa, Chlebu, Stien a Poludňového grúna.

Čo sa týka syngenetickej vzťahov spoločenstva, asi najbližšia v študovanej oblasti sa javí asociácia *Diantho nitidi-Seslerietum tatrae* Bělohlávková in Kliment et al. 2005, zaraďovaná do triedy *Elyno-Seslerietea* Br.-Bl. 1948 a radu *Seslerion tatrae* Pawłowski 1935 corr. Klika 1955. Častokrát sa stáva, že fytocenózy oboch asociácií vytvárajú mozaiku. Vlhkomilnejšie *Festucetum carpaticae* osídľuje konkávnejšie depresie v svahoch a *Diantho nitidi-Seslerietum tatrae* tvorí porasty na konvexnejších plôškach okolo, pričom dominantný druh spoločenstva *Sesleria tatrae* často preniká do porastov asociácie *Festucetum carpaticae*. Je to však druh veľmi plastický a vyskytuje sa v rôznych asociáciách, nezriedka aj s pomerne vysokou pokryvnosťou (Sillinger 1932).

Vychádzajúc z rozdielnych ekologickej podmienok a floristického zloženia zaznamenaných porastov možno hodnotiť variabilitu spoločenstva na úrovni troch variantov

1) Variant s *Trisetum flavescens* je pozitívne diferencovaný vápnomilnými druhmi viazanými na chránené záveterné polohy (*Cyanus mollis*, *Lilium martagon*, *Lotus corniculatus*, *Vicia oreophila*) a vysokosteblovými druhmi tráv (*Calamagrostis arundinacea*, *Poa chaixii*, *Trisetum flavescens*). Na zaznamenaných lokalitách prevládali iné ako severné orientácie svahov. Práve do tohto variantu sú zaraďované porasty s výskytom viacerých pôvodne lesných druhov (*Asarum europaeum*, *Clinopodium vulgare*, *Convalaria majalis*, *Lathyrus vernus*, *Mercurialis perennis*, *Symphytum tuberosum* a pod.) vysoko nad hornou hranicou lesa. Podľa autorov Šibík et al. (2004) priažnivé podmienky, akými sú južne orientované svahy, záveterná poloha a ochrana porastov hlbokou snehovou pokrývkou počas zimných

a jarných mesiacov, kedy dochádza k výrazným zmenám teplôt v priebehu dňa, umožnili ich výskyt v neobvykle vysokých polohách, pričom niektoré lesné druhy práve v týchto porastoch dosahujú svoje výškové maximum na území Slovenska. Ložek (1972) predpokladá,




Obr. 1 Dendrogram numerickej klasifikácie 67 zápisov z asociácie *Festucetum carpaticae* z územia Krivánskej Malej Fatry. Poradie zápisov v dendrograme (číselné označenie) súhlasí s poradím zápisov v tabuľke č. 1, v ktorej sú však vyniechané zápisy iných autorov (označené písmenom „x“, pozri tiež kapitolu Metodika). Použité parametre: Wardova metóda, Euklidovská vzdialenosť, odmocninová transformácia dát. A – variant s *Trisetum flavescens*, B – variant so *Swertia *alpestris*, C – variant s *Calamagrostis varia*.

že ide o mladé relikty z obdobia klimatického optima postglaciálu v epiatlantiku.

2) Porasty **variantu so *Swertia *alpestris*** sa vyznačujú výskytom na strmých lavičných svahoch ($25 - 50^\circ$) takmer výlučne severných expozícií (SZ – SV). Ide o vlhkomilnejší, sutinovejší variant. Poukazuje na to aj priemerná pokryvnosť machorastov, ktorej hodnota je dvojnásobná oproti zvyšnému dvom variantom (16 %) a výskyt viacerých vlhkomilných až prameniskových (pod)druhov, z ktorých ho pozitívne diferencujú *Cortusa matthioli*, *Crepis paludosa*, *Chaerophyllum hirsutum*, *Myosotis alpestris*, *Saxifraga rotundifolia*, *Swertia *alpestris*, *Valeriana tripteris*. Okrem týchto patria medzi diferenciálne druhy aj *Biscutella laevigata* a *Salix silesiaca*.

3) **Variant s *Calamagrostis varia*** predstavuje heterogénnejší typ vegetácie, v ktorej nezriedka prevláda iná dominanta ako *Festuca carpatica*. Už Milová, Urbanová (1989) vo svojej práci o NPR Prípor udávajú, že v asociácii *Festucetum carpaticae* často prevláda



Obr. 2 Ordinačný graf nepriamej gradientovej analýzy (DCA) 67 zápisov z asociácie *Festucetum carpaticae* z územia Krivánskej Malej Fatry. Eigenvalues: 1. os 0.448, 2. os 0.296; dĺžky gradientu: 1. os 3.440, 2. os 2.723. Zobrazené sú druhy s váhou (species weight range) > 2 %. 1 – variant s *Trisetum flavesescens*, 2 – variant so *Swertia *alpestris*, 3 – variant s *Calamagrostis varia*. Skratky mien taxónov: Achimila – *Achillea millefolium* subsp. *alpestris*, Aconfirm – *Aconitum firmum* subsp. *moravicum*, Alchsp.d – *Alchemilla spec. div.*, Astrmajo – *Astrantia major*, Bistmajo – *Bistorta major*, Calaarun – *Calamagrostis arundinacea*, Calavari – *Calamagrostis varia*, Calavill – *Calamagrostis villosa*, Camperr – *Campanula serrata*, Careflac – *Carex flacca*, Caresemt – *Carex tatarorum*, Cortmatt – *Cortusa matthioli*, Cyanmoll – *Cyanus mollis*, Dactglom – *Dactylis glomerata*, Festcarp – *Festuca carpatica*, Gerasylv – *Geranium sylvaticum*, Geumriva – *Geum rivale*, Heraspho – *Heracleum sphondylium*, Hypemacu – *Hypericum maculatum*, Knauarve – *Knautia arvensis* agg., Luzuluzo – *Luzula luzuloides*, Luzusylv – *Luzula sylvatica*, Pimpmaj – *Pimpinella major*, Primelat – *Primula elatior*, Sesltatr – *Sesleria tatrae*, Soldcarp – *Soldanella carpatica*, Swerpere – *Swertia perennis*, Trisflav – *Trisetum flavesescens*, Vaccmyrt – *Vaccinium myrtillus*, Valetrip – *Valeriana tripteris*, Violbifl – *Viola biflora*.

aj *Calamagrostis varia*. Sillinger (1930) zaznamenal na hrebeni Tanečnice vo Veľkej Fatre porasty spoločenstva *Festucetum carpaticae* s častým výskytom druhu *Calamagrostis varia* [ktoré nazýval aj *Festuceto (carpaticae)-Calamagrostidetum (variae)*], pričom jeho početnosť stúpala miestami do takej miery, že sa stával dominantou. Rozsiahlejšie syntézy z územia Západných Karpát (Kliment et al. 2004) potvrdili správnosť zaradovania niektorých porastov s dominantným druhom *Calamagrostis varia* do asociácie *Festucetum carpaticae*. Autori tiež poukazujú na vzájomné syngeneticke vzťahy k asociácii *Geranio sylvatici-Calamagrostietum variae* zo zväzu *Calamagrostion variae*, ktorá však nebola v Krivánskej Malej Fatre doposiaľ zaznamenaná. Najbližšie k spomínamej asociácii má zápis č. 44 (tab. 1, obr. 1), z ktorého floristického zloženia vyplýva určitá afinita k porastom asociácie *Geranio sylvatici-Calamagrostietum variae*. S výnimkou druhov *Sesleria tatrae* a *Bartsia alpina* chýbajú ďalšie diagnostické taxóny asociácie *Festucetum carpaticae* a zväzu *Festucion carpaticae*, vrátane *Festuca carpatica*, na druhej strane však zápis obsa-

huje viaceré diferenciálne druhy asociácie *Geranio-Calamagrostietum variae*. Na základe numerických analýz všetkých dostupných dát vysokobylinných spoločenstiev z územia Krivánskej Malej Fatry a nedostatku ďalšieho porovnávacieho materiálu však ponechávame tento sporný zápis ako súčasť asociácie *Festucetum carpaticae* so zdôraznením jeho prechodného postavenia.

Do variantu s *Calamagrostis varia* sa pri numerických analýzach začlenili aj porasty, v ktorých prevládal taxón *Dactylis *slovenica* (tab. 1, z. 49, 50) prípadne *Bistorta major* (tab. 1, z. 48). Tieto sa vyskytujú na vlhších stanovištiach žľabového charakteru a predstavujú určitý medzičlánok k asociácii *Aconito firmi-Adenostyletum alliariae* Domin 1930 (*Delphinienion elati, Adenostylium*).

Priestorové usporiadanie zaznamenaných zápisov a vzťahy medzi jednotlivými variantmi znázorňuje graf nepriamej gradientovej analýzy (obr. 2).

Poděkovanie

Za pomoc v teréne ďakujeme Dr. Z. Dúbravcovej a Dr. J. Klimentovi, za determináciu machorastov Dr. K. Mišíkovej a Dr. R. Šoltésovi, D. Treplanovej za stanovenie pH. Príspěvok vznikol za podporu projektu VEGA 2/6057/06.

Literatúra

- BARKMAN, J. J., DOING, H., SEGAL, S., 1964: Kritische Bemerkungen und Vorschläge zur quantitativen Vegetationsanalyse. *Acta Bot. Neerl.*, 13: 394-419.
- BĚLOHLÁVKOVÁ, R., 1980: Rostlinná spoločenstva alpínskeho stupňa Krivánske Malé Fatry. msc. (Kandidátska dizertačná práca, depon. in: Správa NP Malá Fatra, Varín).
- BĚLOHLÁVKOVÁ, R., FIŠEROVÁ, D., 1989: *Festucion carpaticae* alliance nova – a new alliance of tall grasslands in the high Carpathian Mountains. *Folia Geobot. Phytotax.*, 24/1: 1-24.
- BRAUN-BLANQUET, J., 1930: Zentralalpen und Tatra, eine pflanzensoziologische Parallele. *Veröff. Geobot. Inst. Rübel Zürich*, 6: 81-123.
- BRAUN-BLANQUET, J., 1964: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Ed. 3. Springer-Verlag, Wien, New York., 865 p.
- DOMIN, K., 1925: *Festucetum carpaticae* v Bielských Tatrách. *Rozpr. České Akad. Věd.* 34/19: 1-25.
- DÚBRAVCOVÁ, Z., HAJDÚK J., 1986: Príspevok k výskumu vegetácie subalpínskeho stupňa Sivého vrchu v Západných Tatrách. *Acta Rer. natur. Mus. Nat. Sci.*, 32: 33-54.
- DÚBRAVCOVÁ, Z., LÍSICKÁ, E., PACLOVÁ, L., 1980: Vegetácia vápencových a dolomitových obvodov Západných Tatier. msc. (Čiastková správa, depon. in: Príroovedecká fakulta UK, Bratislava).
- HADAČ, E., 1956: Rostlinná spoločenstva Temnosmrečinové doliny ve Vysokých Tatrách. *Biol. Práce Slov. Akad. Vied*, 2/1: 1-78.
- HADAČ, E., 1969: The distribution of *Galium silvaticum* L. and *G. schultesii* Vest in Czechoslovakia. *Preslia*, 41: 39-60.
- HADAČ, E., SLAVÍK, B., RICHTEROVÁ, H., 1967: The distribution of *Pleurospermum austriacum* (L.) Hoffm. in Czechoslovakia. *Preslia*, 39: 375-391.
- HADAČ, E., BŘEZINA, P., JEŽEK, V., KUBIČKA, J., HADAČOVÁ, V., VONDRAČEK, M. et al., 1969: Die Pflanzengesellschaften des Tales „Dolina Siedmich prameňov“ in der Belauer Tatra. *Vegetácia ČSSR*, Ser. B, 2: 5-343.

- HAŠKO, J., POLÁK, M., 1980: Geologická mapa Kysuckých vrchov a Krivánskej Malej Fatry. Regionálne geologické mapy Slovenska. 1: 50 000. Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 1 mapa.
- HENNEKENS, S. M., SCHAMINÉE, J. H. J., 2001: TURBOVEG, a comprehensive data base management system for vegetation data. *J. Veg. Sci.*, 12: 589-591.
- HERBEN, T., MÜNZBERGOVÁ, Z., 2003: Zpracování geobotanických dat v příkladech. Část 1. Data o druhovém složení. Praha, 118 p. [<http://botany.natur.cuni.cz/pdf/multivar.pdf>]
- HRAŠKO, J., ČERVENKA, L., FACEK, Z., KOMÁR, J., NĚMĚČEK, J., POSPÍŠIL, F., SIROVÝ, V., 1962: Rozbory pôd. Slovenské vydavatelstvo pôdohospodárskej literatúry, Bratislava, 342 p.
- KLIMENT, J., VALACHOVIČ, M. (eds), 2007: Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 4. Vysokohorská vegetácia. Veda, Bratislava, 388 p.
- KLIMENT, J., JAROLÍMEK, I., ŠIBÍK, J., VALACHOVIČ, M., 2004: Syntaxonomy and nomenclature of the communities of the orders *Calamagrostietalia villosae* and *Adenostyle-talia* in Slovakia. *Thaisia-J. Bot.*, 14: 93-157.
- KLIMENT, J., JAROLÍMEK, I., ŠIBÍK, J., 2007: *Mulgedio-Aconitetea* Hadač et Klika in Klika 1948.-In: KLIMENT, J., VALACHOVIČ, M. (eds). Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 4. Vysokohorská vegetácia. Veda, Bratislava, p. 21-129.
- KRAJČIOVÁ-ŠIBÍKOVÁ, I., ŠIBÍK, J., JAROLÍMEK, I., MIŠÍKOVÁ, K., 2005: Asociácia *Adestylo alliariae-Athyrietum alpestris* (Zlatník 1928) Jeník 1961 v Krivánskej Fatre. *Bull. Slov. Bot. Spoločn.*, 27: 199-206.
- LEPŠ, J., ŠMILAUER, P., 2000: Mnohorozmerná analýza ekologických dat. Biologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, 102 p. [<http://regent.bf.jcu.cz/skripta.pdf>]
- LOŽEK, V., 1972: Z historie přírody Malé Fatry. *Ochr. Přír.*, 9: 206-209.
- MARHOLD, K., HINDÁK, F. (eds), 1998: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Veda, Bratislava, 687 p.
- MCCUNE, B., MEFFORD, M. J., 1999: PC-ORD. Multivariate analysis of ecological data, version 4.0. MJM Software Design, Gleneden Beach, Oregon. 237 p.
- MILOVÁ, M., URBANOVÁ, V., 1989: Nelesné rastlinné spoločenstvá Štátnej prírodnej rezervácie Prípor. *Ochr. Přír.*, 10: 289-309.
- PAWŁOWSKI, B., SOKOŁOWSKI, M., WALLISCH, K., 1928: Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. VII. Teil. Die Pflanzenassoziationen und die Flora des Morskie Oko-Tales. *Bull. Int. Acad. Polon. Sci., Cl. Sci. Math.*, Ser. B, Cracovie, Suppl. 2: 205-272.
- PAWŁOWSKI, B., STECKI, K., 1927: Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. IV. Teil: Die Pflanzenassoziationen des Miętusia-Tales und des Hauptmassivs der Czerwone Wierchy. *Bull. Int. Acad. Polon. Sci., Cl. Sci. Math.*, Ser. B, Sci. Nath., Suppl. 2: 79-121.
- SILLINGER, P., 1930: Příspěvek ku květeně Velké Fatry. *Věda Přír.*, 11/5-7: 132-134.
- SILLINGER, P., 1932: *Festucetum carpaticae* v Nízkých Tatrách ve srovnání s analogickou asociaci v jiných částech oblasti západokarpatské. *Rozpr. České Akad. Věd, Tř. 2, Vědy Mat.-Přír.*, 41 (1931)/16: 1-21.
- SILLINGER, P., 1933: Monografická studie o vegetaci Nízkých Tater. Orbis, Praha, 339 p.
- SZAFAŘER, W., PAWŁOWSKI, B., KULCZYŃSKI, S., 1927: Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges. Teil III. Die Pflanzenassoziationen des Kościeliska-Tales. *Bull. Int. Acad. Polon. Sci., Cl. Sci. Math.*, Ser. B, Sci. Nath., Suppl. 2: 13-78.
- ŠIBÍK, J., 2003: Nelesné spoločenstvá subalpinskeho stupňa Krivánskej Malej Fatry. 121 s., ms. (Diplomová práca, depon. in: Prírodrovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra botaniky, Bratislava).
- ŠIBÍK, J., KLIMENT, J., KRAJČIOVÁ, I., 2004: Zaujímavejšie floristické nálezy z Krivánskej

- Malej Fatry. *Bull. Slov. Bot. Spoločn.*, 26: 61-69.
- ŠIBÍKOVÁ, I., 2006: Vysokobylinné spoločenstvá (rieda *Mulgedio-Aconitetea*) v subalpínskom stupni Krivánskej Malej Fatry. 171s., ms. (Diplomová práca, depon. in: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra botaniky, Bratislava).
- ŠIBÍKOVÁ, I., ŠIBÍK, J., JAROLÍMEK, I., 2007: Zriedkavé rastlinné spoločenstvá triedy *Mulgedio-Aconitetea* v Krivánskej Malej Fatre. *Bull. Slov. Bot. Spoločn.*, 29: 158-169.
- ŠIBÍKOVÁ, I., ŠIBÍK, J., JAROLÍMEK, I., 2008: Floristický výskum v NPR Chleb. *Naturae tutela*, 12: 39-56. [ŠIBÍKOVÁ et al. 2008a]
- ŠIBÍKOVÁ, I., ŠIBÍK, J., JAROLÍMEK, I., 2008: Asociácia *Aconito firmi-Adenostyletum alliae* Domin 1930 v Krivánskej Malej Fatre. *Bull. Slov. Bot. Spoločn.*, 30/1: 69-88. [ŠIBÍKOVÁ et al. 2008b]
- ŠIBÍKOVÁ, I., ŠIBÍK, J., JAROLÍMEK, I., KLIMENT, J., 2008: The tall-herb and tall-grass plant communities of the class *Mulgedio-Aconitetea* in the subalpine belt of the Krivánska Malá Fatra Mts (Slovakia). *Hacquetia*, 7/2: 51-69. [ŠIBÍKOVÁ et al. 2008c]
- ŠMARDA, J., LAZEBNÍČEK, J., MATOUŠOVÁ, L., NETOPIL, R., PACLOVÁ, L., PIKULA, J., 1971 : K ekologii rostlinných společenstev Doliny Sedmi pramenů v Belanských Tatrách. *Práce a Štúd. Českoslov. Ochr. Prír.*, Ser. 3, 4: 1-204.
- TICHÝ, L., 2002; JUICE, software for vegetation classification. *J. Veg. Sci.*, 13: 451-453.
- UNAR, J., UNAROVÁ, M., ŠMARDA, J., 1984: Vegetační poměry Tomanovy doliny a Žlebu spod Diery v Západních Tatrách. 1. Fytocenologické tabulky. *Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purkynianae Brun.*, Ser. Biol., 25/10: 5-101.
- UNAR, J., UNAROVÁ, M., ŠMARDA, J., 1985: Vegetační poměry Tomanovy doliny a Žlebu spod Diery v Západních Tatrách. 2. Charakteristika přírodních poměrů a rostlinných společenstev. *Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Purkynianae Brun.*, Ser. Biol., 26/14: 5-78.
- URBANOVÁ, V., 1991: Trávnatobylinné spoločenstvá ŠPR Suchý v Malej Fatre. *Vlastivedný Zborník Považia*, 16: 181-194.
- WESTHOFF, V., VAN DEN MAAREL, E., 1978: The Braun-Blanquet approach. In: Whittaker, R. H. (ed.): Classification of plant communities. W. Junk, The Hague, p. 289-399.

Adresy autorov:

- RNDr. Ivana Šibíková, Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 14, 845 23 Bratislava 4, Slovensko, e-mail: ivana.sibikova@savba.sk;
- RNDr. Jozef Šibík, PhD., Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 14, 845 23 Bratislava 4, Slovensko, e-mail: jozef.sibik@savba.sk;
- RNDr. Ivan Jarolímek, CSc., Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 14, 845 23 Bratislava 4, Slovensko, e-mail: ivan.jarolimek@savba.sk;
- RNDr. Jana Uhlířová, Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum, Vajanského nábrežie 2, P.O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16, Slovensko, e-mail: uhlirova@snm.sk.

Tab. 1 *Festucetum carpatiae* Domin 1925 v *Krivánskej Malej Fatre*

Číslo zápisu	00000000001111111122222222 12345678901234567890123456	2223333333334444 7890123456789012	444444445 34567890
Počet taxónov	3443334333432324443355455 63519718964283819128976910	3353334445445333 5414563220442798	44333234 46678820
Diagnostická skupina taxónov			
fC	<i>Festuca carpatica</i>	I	445454555545555544444543 +mm++1+m+++++.++1r+
	<i>Soldanella carpatica</i>	I	+1a11+1at...+1+.+.++1a
MU	<i>Primula elatior</i>	I	a11+1111+a111+11
st	<i>Sesleria tatrae</i>	I	•+11+1+a...+11++11+.ab1
	<i>Knautia arvensis</i> agg.	I	+1+++.+11+r.+11a1+.+1++
Cv	<i>Crepis mollis</i>	I	+1+++.++11+1...++1++1++1+
ES	<i>Phyteuma orbiculare</i>	I	+1+++.+++++1r.+1...++
ES	<i>Galium anisophyllum</i>	I	+1++...++...++...++1r
Cv	<i>Astrantia major</i>	I	..a.+1+1la...++1+...++
	<i>Bartsia alpina</i>	I	..++...x.+...++...++...++
ES	<i>Carex *tatrorum</i>	I+...+...+.....+...++1
ES	<i>Scabiosa lucida</i>	I+.....+...+...+...+.
ES	<i>Bellidiastrum michelii</i>	I+.....+...+...+...+.
	<i>Tithymalus amygdaloides</i>	I+...+...+...+...+...+.
	<i>Carex *flacca</i>	D+.....b...4
MU	<i>Geranium sylvaticum</i>	K	3bbb3abb3bbbaalb1111aaaall
	<i>Heracleum sphondylium</i>	K	a.1++11aa+a1+11+1+1+1.a1
	<i>Hypericum maculatum</i>	K	1111+1aa+a1+11+1+1+1.a1.13
	<i>Alchemilla sp.</i>	K	b1bab+1albb1a...1++1+1+.+1a1
Cv	<i>Campanula serrata</i>	K	+...++...+1++1++1++1++1++1++
Cv	<i>Achillea *alpestris</i>	K	1+1++1+1++1++1+1+1+1+1++
	<i>Luzula sylvatica</i>	K	+...+1+11+.++...++1.1.aaalbaaallaaala
	<i>Geum rivale</i>	K	+...+...+...+bb1...++...+13b.
Variant s <i>Trisetum flavescens</i>			

	<i>Triisetum flavescens</i>	.11++b...1a++...++ab1.1..1	..a+.....	1.....1	40
	<i>Lilium martagon</i>	.1.+.r+...r.+r.+1+	r+.....	30
ca	<i>Calamagrostis arundinacea</i>	.1...+....+....++31+1...	a a.....	24
ca	<i>Vicia oreophila</i>	.++++1...+.+....++....	++.....	24
MU	<i>Poa chaixii</i>	+....+....1++...++1.+....	..r+.....	22
	<i>Lotus corniculatus s. l.</i>	I .11.r rr...r.+...+r.....	+.....	20
Cv	<i>Cyanus mollis</i>++..aa3aa..b	++.....	18
Variant so <i>Swertia *alpestris</i>						
	<i>Cortusa matthioli</i>	Ia...++.....11aa1	b1+1bbaaa1a++1	...1...+	52	
	<i>Swertia *alpestris</i>	I1.....	.1+++.+b1+1ba1b	30	
PC	<i>Valeriana tripteris</i>	I+1...+.+.	1.+1+1..aaa31b	.a11....	36	
	<i>Saxifraga rotundifolia</i>111.1++..11+..1a...	22	
po	<i>Chaerophyllum hirsutum</i>+1+	+...+...+.+1.1b1.	24	
	<i>Myosotis alpestris</i>	++...r...++r+	16	
ss	<i>Salix silesiaca</i>+....	...++1...++1...++..	24	
MC	<i>Crepis paludosa</i>r+	.++...++r...++a+	20	
ES	<i>Biscutella laevigata</i>	I++..++..+1+	12	
Variant s <i>Calamagrostis varia</i>						
Cv	<i>Pimpinella *rhodochlamys</i>11a1.....+..+1+..+1+..	1+11+..+	34	
cr	<i>Calamagrostis varia</i>	D+a.....	444.3...	14	
	<i>Dactylis *slovenica</i>	D .+++.b.....a1+...+45	22	
Calamagrostietalia villosae						
	<i>Luzula *rubella</i>	...++1..++1a1..+1+1111a1+1.+.....1a.....	1.+...a.1	56	
	<i>Campanula elliptica</i>	+11+..r.+..+..++t++..+++.....	r1+r....	44	
	<i>Cirsium erisithales</i>	.1+1...++...++...++ta1aa1	1.1...++	40	
	<i>Phleum hirsutum</i>	.1...+...+r...++...++..1++	++...++...++..	.1+.....	36	
tf	<i>Rhodiola rosea</i>	++1+1.....1.....+++.a.	a.1a.....++...++..	34	
cv	<i>Calamagrostis villosa</i>	1.....a.a.1...b.1...ba..31a.+1+	28	
	<i>Linum extraaxillare</i>	...+....1.....1+1++..++	+1+.....	26	
	<i>Anemone narcissiflora</i>r...r.+r+..+++ +	++.....	22	
	<i>Solidago *minuta</i>r.....r...++	+r.....+	16	

Číslo zápisu		00000000111111111222222222	22233333333444	444444445
		12345678901234567890123456	7890123456789012	34567890
Počet taxónov		3443334333432324443355455	335333444545333	44333234
LV	Vaccinium vitis-idaea	.+..r.....+.....++.....+.....+1	+.
	<i>Myosotis sylvatica</i>+.....+++..+.++...+ ..
	<i>Phyteuma spicatum</i>	..+...+a1+..+.	b+
	<i>Rubus idaeus</i>++..+1+..+.ba..
	<i>Anthoxanthum alpinum</i>r.....1..1..++..+.+
	<i>Ranunculus pseudomontanus</i>++.....++..r.+..	..+
	<i>Vicia sepium</i>1..1....++..+.	1....++
	<i>Parnassia palustris</i>	r.....r.....	1..+..r..+
	<i>Mercurialis perennis</i>1..+..+.....++..a+
	<i>Rubus saxatilis</i>+.....11.....++	+ ..b ..
	<i>Asarum europaeum</i>+.....a.....11..+1+ ..
	<i>Rhinanthus pulcher</i>	a111.....+++
	<i>Coeloglossum viride</i>	r.....r.....+++
	<i>Avenella flexuosa</i>	..+..+.....+++
	<i>Taraxacum sp.</i>+.....r.....++
	<i>Galium mollugo</i> agg.+.....+a.....++
pm	<i>Pinus mugo</i>+++
	<i>Vicia cracca</i>+1.....+	11.....+
ss	<i>Lathyrus vernus</i>1.....r.....++
	<i>Myosotis nemorosa</i>+ ..+++
ar	<i>Arabis alpina</i>1.....1.....r..b ..
	<i>Poa nemoralis</i>+.....1+++
	<i>Convallaria majalis</i>r..+.+1r....
Machorasy (E₀)				
	<i>Plagiomnium affine</i>	b+..+.....+...+..	1+...b1..1+1+....+...+ ..
	<i>Rhytidiodelphus squarrosum</i>	.1.....+1343ab..1..a ..
	<i>Tortella tortuosa</i>++.....+..+	1.....+1

zájazdový vyskúšajúce sa v troch zápisoch:

E₁: *Agristis capillaris* (5), 1 (1); *Festuca versicolor* + (5), + (11), + (19); *Galeobdolon luteum* + (11), 1 (25), + (41); *Galeobdolon montanum* + (14), + (49), 2a (50); *Hieracium bifidum* r (36), r (37), + (44); *Chamerion angustifolium* 1 (4), + (14), 1 (48); *Scrophularia scopolii* + (22), + (43), + (47); *Thalictrum minus* 1 (7), 1 (8), + (17); *Thymus alpestris* + (17), + (20), + (45); *Urtica dioica* r (34), + (36), + (47).

E₀: *Brachythecium* sp. 2a (13), 2a (30), 3 (48); *Brachythecium starkei* 2a (12), + (32), 2a (41); *Leskeia polycarpa* + (4), + (11), + (27); *Mnium spinosum* + (1), 1 (2), 1 (33); *Pleurozium schreberi* + (35), + (37), 2a (46); *Rhodobryum roseum* + (2), + (31), + (39); *Rhytidadelphus* sp. 2a (12), 2b (13), 1 (48).

zájazdový vysketyljičce sa v dvoch zápisoch:

E_i: Acer pseudoplatanus + (32), 1 (33); Adoxa moschatellina + (49), + (50); Angelica archangelica + (9), 1 (10); Arabis hirsuta + (11), + (43); Cystopteris fragilis r (47), r (50); Briza media + (21), 2a (44); Clinopodium vulgare + (33), + (43); Cystopteris montana + (37), + (38); Digitalis grandiflora + (32), + (38); Epilobium montanum + (33), + (43); Festuca supina + (12), 1 (44); Galium schulthesis + (23), + (32); Hesperis* nivea 1 (22), + (23); Linum catharticum + (21), + (44); Malanthemum bifolium + (8), + (33); Sphagnum viride r (19), + (39); Pulmonaria obscura + (22), 1 (23); Selaginella selaginoides r (38), r (42); Silene vulgaris 1 (24), 1 (25); Stachys alpina + (23), + (43); Aretosa crinitata 1 (39) 2b (46); Trifolium pratense + (1) + (36)

E₀: *Brachythecium reflexum* + (24), 1 (36)

záxon vyskytujíce sa v jednom zápis:

Rhinanthus minor + (29); *Rhinanthus sp.* + (9); *Salix reticulata* + (38); *Saxifraga paniculata* + (19); *Sorbus aucuparia* r (7); *Thymus sp.* + (4).
F₀: *Bartlophozia hypododioides* + (29); *Brachythecium velutinum* + (24); *Bryum capillare* + (11); *C. stellatum* + (38); *Cladonia pyxidata* + (11); *Cleidium mucosum* + (35); *Dicranum scoparium* + (38); *Fissidens adianthoides* + (31); *F. dubius* + (38); *Homalothecium sericeum* + (44); *Leptodon pyrenaicum* + (47); *Hypnum sp.* 3 (48); *Plagiochila asplenoides* + (46); *Plagiothecium sp.* + (12); *Pohlia mutans* + (34); *Pohlia sp.* + (31); *Polytrichum formosum* 2 (48); *Pohlia nobilis* ssp. 1 (48); *Paroletia heterostoma* + (47).

V tabule boli pouříti následovný skratky syntaxónov: ar *Arabidion alpinae*, ca *Calamagrostion arundinaceae*, cf *Caricion firmae*, cr *Calamagrostion variae*, cv *Carex sylvatica*, d *Dactylion glomeratae*, de *Delphinium elatii*, fc *Festucion carpaticae*, fm *Pinion mugo*, fo *Petasition officinalis*, sa *Astro alpini-Seslerion calcariae*, ss *Salicion silesiacae*, st *Seslerion tatrae*, tf *Trisetion fuscii*, Cv *Calamagrostitalia villosae*, Pc *Potentillitalia caulescens*, AT *Asplenietea trichomanis*, ES *Elyno-Sesleretea*, MC *Montio-Cardaminetea*, MU *Mulgedio-Aconitetea*, NS *Nardetea strictae*, TR *Thlaspietea rotundifoliae*.

Lokality zápisov k tabuľke 1:

1. Krivánska Malá Fatra (KMF), Steny, južne od turistického chodníka smerom na Poludňový grúň, žlab tesne pod hrebeňom; 1 529 m n. m.; 49°11'50,2" s. š.; 19°03'49,7" v. d.; V, sklon 25°, podklad: sienité vápence, plocha: 16 m², celková pokryvnosť: 100 %, E_i: 100 %, E_o: 30 %, 27. 7. 2004; IŠ & JŠ.
2. KMF, Steny, žlab pod hrebeňom smerom na Poludňový grúň; 1 565 m n. m.; 49°11'47,3" s. š.; 19°03'48,0" v. d.; VJV, sklon 20°, podklad: sienité vápence; pH (H₂O): 4,86; pH (KCl): 4,48; plocha: 21 m², celková pokryvnosť: 100 %, E_i: 100 %, E_o: 5 %, 27. 7. 2004; IŠ, II & JŠ.
3. KMF, Steny, žlab pod hrebeňom smerom na Poludňový grúň; 1 600 m n. m.; 49°11'39,0" s. š.; 19°03'42,5" v. d.; VJV, sklon 15°, podklad: sienité vápence, plocha: 20 m², celková pokryvnosť: 100 %, E_i: 100 %, E_o: 0 %, 27. 7. 2004; IŠ, II & JŠ.
4. KMF, Steny, južný vrchol, tesne pod turistickým chodníkom, nad žľabom s *Chamerion angustifolium*, *Alchemilla* sp.; 1 573 m n. m.; 49°11'27,9" s. š.; 19°03'37,3" v. d.; JJZ, sklon 20°, podklad: sienité vápence, plocha: 15 m², celková pokryvnosť: 98 %, E_i: 98 %, E_o: 1 %, 28. 7. 2004; IŠ, II & JŠ.
5. KMF, Steny, na hrebienku pod vrcholom, mierna depresia medzi dvoma hrebienkami, plocha je nepravidelná; 1 558 m n. m.; 49°11'28,3" s. š.; 19°03'40,9" v. d.; JV, sklon 5°, podklad: sienité vápence; pH (H₂O): 4,94; pH (KCl): 4,70; plocha: 20 m², celková pokryvnosť: 100 %, E_i: 100 %, E_o: 1 %, 3. 8. 2005; IŠ & JŠ.
6. KMF, Malý Kriváň, východný svah oproti kremencovému bočnému hrebienku vychádzajúcemu od vrcholu Malého Kriváňa, mierny hrebienok uprostred veľkého lavínového žľabu, pod veľkými výraznými odkryvmi po lavíne, v podraste mnoho stariny; 1 452 m n. m.; 49°11'08,3" s. š.; 19°00'09,8" v. d.; V, sklon 30°, podklad: vápence; pH (H₂O): 6,66; pH (KCl): 6,26; plocha: 24 m², celková pokryvnosť: 100 %, E_i: 100 %, E_o: 0 %, 28. 7. 2005; IŠ & JŠ.
7. KMF, Poludňový grúň, pod turistickým chodníkom vedúcim do Stohového sedla, strmý, mierne vhĺbený svah; 1 400 m n. m.; 49°12'45,4" s. š.; 19°04'03,0" v. d.; SZ, sklon 35°, podklad: sienité vápence, plocha: 30 m², celková pokryvnosť: 100 %, E_i: 100 %, E_o: 10 – 15 %, machorasty neboli determinované; 16. 7. 2003; IŠ & JŠ.
8. KMF, Poludňový grúň, pod turistickým chodníkom vedúcim do Stohového sedla, strmý, mierne vhĺbený svah; 1 405 m n. m.; 49°12'45,4" s. š.; 19°04'08,4" v. d.; SV, sklon 40°, podklad: sienité vápence, plocha: 25 m², celková pokryvnosť: 100 %, E_i: 100 %, E_o: 50 %, machorasty neboli determinované; 16. 7. 2003; IŠ & JŠ.
9. KMF, Poludňový grúň, pod turistickým chodníkom vedúcim do Stohového sedla, strmý, mierne vhĺbený svah; 1 380 m n. m.; 49°12'50,4" s. š.; 19°04'28,2" v. d.; S, sklon 25°, podklad: sienité vápence, plocha: 16 m², celková pokryvnosť: 100 %, E_i: 100 %, E_o: 30 %, machorasty neboli determinované; 16. 7. 2003; IŠ & JŠ.
10. KMF, Poludňový grúň, pod turistickým chodníkom vedúcim do Stohového sedla, nad žľabom spadajúcim k Štefanovej, strmý, mierne vhĺbený svah; 1 370 m n. m.; 49°12'54,4" s. š.; 19°04'33,6" v. d.; S, sklon 25°, podklad: sienité vápence, plocha: 18 m², celková pokryvnosť: 100 %, E_i: 100 %, E_o: 10 %, machorasty neboli determinované; 16. 7. 2003; IŠ & JŠ.
11. KMF, Chleb, žlabok v hrebienku pod vrcholom, v blízkosti vrcholových skál, vedľa nápadného skalného útvaru, v ploche sa nachádzali skalky; 1 600 m n. m.; 49°11'14,5" s. š.; 19°03'08,2" v. d.; JV, sklon 30°, podklad: vápence; pH (H₂O): 6,78; pH (KCl): 6,48; plocha: 24 m², celková pokryvnosť: 100 %, E_i: 100 %, E_o: 3 %; 4. 8. 2005; IŠ & JŠ.
12. KMF, Malý Kriváň, svah pod sedlom zo severnej strany; 1 560 m n. m.; 49°11'06,2" s. š.; 18°59'50,8" v. d.; VSV, sklon 45°, podklad: vápence + kremičité pieskovce, plocha: 25 m², celková pokryvnosť: 100 %, E_i: 100 %, E_o: 25 %; 31. 7. 2002; IJ.
13. KMF, Malý Kriváň, svah pod stenou skalného útvaru Sviňa; 1 510 m n. m.; 49°11'15,7" s. š.; 19°00'04,9" v. d.; Z, sklon 40°, podklad: vápence, plocha: 24 m², celková pokryvnosť: 100 %, E_i: 100 %, E_o: 40 %; 1. 8. 2002; IJ.
14. KMF, Pekelník, mierny žlab pred vrcholovými skalkami na hrebeni pod turistickým chodníkom; 1 598 m n. m.; 49°11'28,2" s. š.; 19°01'15,8" v. d.; J, sklon 20°, podklad: vápence, plocha: 20 m², celková

- pokryvnosť: 100 %, E_i: 100 %, E_o: 0 %; 23. 7. 2003; JŠ & JK, (pozri tiež ŠIBÍK et al. 2004, str. 67).
15. KMF, Malý Kriváň, smerom do sedla Priehyb, okraj žľabu, pri poraste kosodreviny; 1 503 m n. m.; 49°11'00,0" s. š.; 18°59'14,5" v. d.; Z, sklon 40°, podklad: vápence, plocha: 16 m², celková pokryvnosť: 100 %, E_i: 100 %, E_o: 0 %; 24. 7. 2003; IŠ & JŠ.
 16. KMF, Veľký Kriváň, svah tesne pod hranou Veľkého Kriváňa, veľmi hustý porast s hrubou vrstvou stariny; 1 645 m n. m.; 49°11'22,2" s. š.; 19°01'43,0" v. d.; ZSZ, sklon 20°, podklad: vápence; pH (H₂O): 5,42; pH (KCl): 4,88; plocha: 24 m², celková pokryvnosť: 100 %, E_i: 100 %, E_o: 1 %; 2. 8. 2005; IŠ & JŠ.
 17. KMF, Pekelník, komplex vystupujúceho, ale nevýrazného skalnatého hrebienka medzi Veľkým Kriváňom a samotným vrcholom Pekelníka, žliabok pod skalnatým hrebienkom. Lokalita zaujímavá výskytom viacerých lesných druhov nad hranicou lesa, napr. *Sympyrum tuberosum*, *Hesperis *nivea*, *Asarum europaeum*, *Galeopsis speciosa*; 1 576 m n. m.; 49°11'25,0" s. š.; 19°01'25,2" v. d.; VJV, sklon 35°, podklad: vápence, plocha: 25 m², celková pokryvnosť: 100 %, E_i: 100 %, E_o: 0 %; 22. 7. 2003; JK & JŠ.
 18. KMF, Pekelník, plochý hrebienok pod skalnatým svahom pod vrcholovými skalami; 1 585 m n. m.; 49°11'26,8" s. š.; 19°01'12,3" v. d.; JJV, sklon 40°, podklad: vápence, plocha: 24 m², celková pokryvnosť: 100 %, E_i: 100 %, E_o: 0 %; 23. 7. 2003; JK & JŠ.
 19. KMF, Pekelník, úzky žliabok pred vrcholom Pekelníka, tesne pod hrebeňom, pod turistickým chodníkom na južnom svahu, machorasty sa vyskytovali len na skalách; 1 606 m n. m.; 49°11'27,4" s. š.; 19°01'11,2" v. d.; JJZ, sklon 50°, podklad: vápence, plocha: 15 m², celková pokryvnosť: 100 %, E_i: 100 %, E_o: 5 %, machorasty neboli determinované; 23. 7. 2003; JK & JŠ.
 20. KMF, Steny, žlab pod vrcholom, skôr svahovitého charakteru, spadajúci do záveru Šútovskej doliny, v mieste, kde sa žlab stáva mierne vypuklejším, pribúda *Calamagrostis arundinacea*; 1 527 m n. m.; 49°11'27,1" s. š.; 19°03'41,5" v. d.; VJV, sklon 45°, podklad: slienité vápence; pH (H₂O): 5,57; pH (KCl): 5,23; plocha: 24 m², celková pokryvnosť: 100 %, E_i: 100 %, E_o: 3 %; 3. 8. 2005; IŠ & JŠ.
 21. KMF, Malý Kriváň, východný svah oproti bočnému kremencovému hrebienku vychádzajúcemu od vrcholu Malého Kriváňa, mierny hrebienok oproti veľkému lavínovému žľabu s veľkým odtrhom po lavíne, smerom k sedlu Koniarky, v podraste mnoho stariny, v blízkosti sú porasty s dominantnými druhami *Sesleria tatrae* a *Carex *tatrorum*; 1 437 m n. m.; 49°11'09,3" s. š.; 19°00'10,9" v. d.; VJV, sklon 35°, podklad: vápence; pH (H₂O): 6,47; pH (KCl): 6,12; plocha: 20 m², celková pokryvnosť: 100 %, E_i: 100 %, E_o: 0 %; 28. 7. 2005; IŠ & JŠ.
 22. KMF, Pekelník, skalnatý komplex medzi samotným vrcholom a Veľkým Kriváňom, mierny žlab uzavretý skalnatými hrebienkami v dolnej časti skalnatého komplexu, výškové maximum pre druhy *Pulmonaria mollis*, *P. obscura*, *Convallaria majalis*; 1 540 m n. m.; 49°11'23,9" s. š.; 19°01'22,1" v. d.; JJV, sklon 40°, podklad: vápence, plocha: 24 m², celková pokryvnosť: 100 %, E_i: 100 %, E_o: 0 %; 22. 7. 2003; JK & JŠ, (pozri tiež Šibík et al. 2004, str. 66, z. 2).
 23. KMF, Pekelník, skalnatý komplex medzi Pekelníkom a Veľkým Kriváňom, dolná časť, žlab uzavretý skalnatými hrebienkami, v blízkosti lesné druhy vystupujúce vysoko nad hornú hranicu lesa: *Digitalis grandiflora* (1525 m n. m.), *Galeopsis speciosa* (1540 m n. m.), *Chaerophyllum aromaticum* (1540 m n. m.), *Clinopodium vulgare* (1530 m n. m.); 1 535 m n. m.; 49°11'23,9" s. š.; 19°01'22,5" v. d.; J, sklon 40°, podklad: vápence, plocha: 21 m², celková pokryvnosť: 100 %, E_i: 100 %, E_o: 0 %; 22. 7. 2003; JK & JŠ.
 24. KMF, Veľký Kriváň, vlhký žliabok pod hrebeňom vedúcim na vrchol, pod skalkami nad žľabom smerujúcim do záveru doliny Studenca, veľmi hustý porast s množstvom stariny; 1 687 m n. m.; 49°11'17,8" s. š.; 19°01'49,0" v. d.; ZSZ, sklon 35°, podklad: vápence; pH (H₂O): 6,35; pH (KCl): 6,23; plocha: 24 m², celková pokryvnosť: 100 %, E_i: 100 %, E_o: 2 %; 2. 8. 2005; IŠ & JŠ.
 25. KMF, Veľký Kriváň, žlab medzi skalnými rebrami smerujúcimi do veľkého žľabu, ktorý sa zvažuje do záveru doliny Studenca, vlhší žlab medzi dvoma skalnými stienkami, veľmi hustý porast s množstvom stariny, plocha nepravidelného tvaru; 1 629 m n. m.; 49°11'18,4" s. š.; 19°01'44,2" v. d.; JZ, sklon 35°, podklad: dolomitické vápence; pH (H₂O): 6,91; pH (KCl): 6,64; plocha: 30 m², celková pokryvnosť: 100 %, E_i: 100 %, E_o: 0 %; 2. 8. 2005; IŠ & JŠ.
 26. KMF, Veľký Kriváň, západný svah pod kótou „Hrana Veľkého Kriváňa“, smerom na Pekelník, horná časť

- začínajúceho lavínového žľabu (toho času s recentnými odkryvmi), svahovitého charakteru; 1 577 m n. m.; $49^{\circ}11'21,8''$ s. š.; $19^{\circ}01'37,6''$ v. d.; Z, sklon 40° , podklad: vápence; pH (H_2O): 6,55; pH (KCl): 6,24; plocha: 24 m^2 , celková pokryvnosť: 95 %, E_i : 95 %, E_o : 1 %, machorasty neboli determinované; 2. 8. 2005; IŠ & JŠ.
27. KMF, Steny, za južným vrcholom, svah blízko žľabov, v ploche sú skalnaté výstupy, na zemi starina, plocha je stupňovitá, machorasty aj na skalách; 1 558 m n. m.; $49^{\circ}11'30,2''$ s. š.; $19^{\circ}03'40,3''$ v. d.; VJV, sklon 35° , podklad: slienité vápence, plocha: 16 m^2 , celková pokryvnosť: 95 %, E_i : 95 %, E_o : 5 %; 28. 7. 2004; IŠ, IJ & JŠ.
28. KMF, Malý Kriváň, žľab smerujúci do Belianskej doliny, mierna priehlbina v žľabe, mnoho stariny v podraste; 1 583 m n. m.; $49^{\circ}10'59,3''$ s. š.; $18^{\circ}59'34,2''$ v. d.; S, sklon 30° , podklad: dolomitické vápence; pH (H_2O): 7,54; pH (KCl): 7,19; plocha: 24 m^2 , celková pokryvnosť: 100 %, E_i : 100 %, E_o : 3 %; 27. 7. 2005; IŠ & JŠ.
29. KMF, Malý Kriváň, druhý menší žľab (mierne konkávny svah) spadajúci do veľkého Markušovho žľabu, severozápadné svahy nad kosodrevinou, pod ostricovými porastami (*Carex firma*) na hrebeni; 1 570 m n. m.; $49^{\circ}11'00,8''$ s. š.; $18^{\circ}59'40,1''$ v. d.; SSV, sklon $25 - 30^{\circ}$, podklad: dolomitické vápence; pH (H_2O): 7,17; pH (KCl): 6,77; plocha: 18 m^2 , celková pokryvnosť: 100 %, E_i : 100 %, E_o : 5 %; 26. 7. 2005; JŠ.
30. KMF, Chleb, bočný svah pod Hromovým sedlom, nad žľabom spadajúcim do Vrátejnej doliny, mierne vhlbený žľab vo svahu; 1 475 m n. m.; $49^{\circ}11'26,3''$ s. š.; $19^{\circ}03'10,6''$ v. d.; SSV, sklon 35° , podklad: slienité vápence, plocha: 16 m^2 , celková pokryvnosť: 100 %, E_i : 100 %, E_o : 15 %; 30. 7. 2002; IJ, ZD & JŠ, (pozri tiež Šibík 2003, str. 63).
31. KMF, Malý Kriváň, smerom k sedlu Priehyb, plochý žľab; 1 550 m n. m.; $49^{\circ}10'57,0''$ s. š.; $18^{\circ}59'18,0''$ v. d.; S, sklon 35° , podklad: vápence, plocha: 24 m^2 , celková pokryvnosť: 100 %, E_i : 100 %, E_o : 5 %; 24. 7. 2003; IJ & IŠ.
32. KMF, Suchý, severný svah, spodná časť vlhšieho lavínového žľabu nad turistickým chodníkom (žltá značka), miesto, kde ústi susedný žľab, mimo plochy *Salix silesiaca*, *Delphinium elatum*, *Pinus mugo*; 1 270 m n. m.; $49^{\circ}10'25,6''$ s. š.; $18^{\circ}57'28,9''$ v. d.; S, sklon 35° , podklad: vápence; pH (H_2O): 5,92; pH (KCl): 5,61; plocha: 15 m^2 , celková pokryvnosť: 100 %, E_i : 100 %, E_o : 40 %; 11. 8. 2004; IŠ & JŠ.
33. KMF, Suchý, severný svah, chrbátik medzi dvoma lavínovými žľabmi nad turistickým chodníkom (žltá značka), zhora i zdola plochu zápisu obklopuje krovitý porast so *Salix silesiaca* a *Pinus mugo*; 1 271 m n. m.; $49^{\circ}10'25,5''$ s. š.; $18^{\circ}57'28,8''$ v. d.; S, sklon 30° , podklad: vápence; pH (H_2O): 6,78; pH (KCl): 6,58; plocha: 16 m^2 , celková pokryvnosť: 100 %, E_i : 95 %, E_o : 70 %; 11. 8. 2004; IŠ & JŠ.
34. KMF, Suchý, najväčší lavínový žľab pod vrcholovými skalami na severnom svahu; 1 373 m n. m.; $49^{\circ}10'20,8''$ s. š.; $18^{\circ}57'27,5''$ v. d.; S, sklon 40° , podklad: vápence; pH (H_2O): 6,64; pH (KCl): 6,48; plocha: 18 m^2 , celková pokryvnosť: 98 %, E_i : 98 %, E_o : 35 %; 11. 8. 2004; IŠ & JŠ.
35. KMF, Malý Kriváň, pod hrebeňom, menší žľab navážajúci na veľký Markušov žľab na severozápadnom svahu, mierny žliaob spadajúci do väčšieho žľabu, v blízkosti je vysadená kosodrevina; 1 627 m n. m.; $49^{\circ}10'57,8''$ s. š.; $18^{\circ}59'41,0''$ v. d.; SSZ, sklon 25° , podklad: vápence; pH (H_2O): 6,64; pH (KCl): 6,48; plocha: 21 m^2 , celková pokryvnosť: 100 %, E_i : 100 %, E_o : 30 %, machorasty neboli determinované; 24. 7. 2003; JŠ & JK.
36. KMF, Stratenec – Suchý, sedlo Vráta, balvanitý žľab zvažujúci sa do Kúrskej doliny; 1 375 m n. m.; $49^{\circ}10'40,2''$ s. š.; $18^{\circ}57'53,7''$ v. d.; SV, sklon 25° , podklad: dolomitické vápence; pH (H_2O): 6,53; pH (KCl): 6,43; plocha: 20 m^2 , celková pokryvnosť: 100 %, E_i : 100 %, E_o : 40 %; 10. 8. 2004; IŠ & JŠ.
37. KMF, Malý Kriváň, severný svah, výraznejšia depresia spadajúca do žľabu pod hrebeňom smerom do sedla Priehyb, okolo rozsiahlejšie plochy s *Carex *tatrorum*, v podraste mnoho stariny; 1 517 m n. m.; $49^{\circ}10'58,9''$ s. š.; $18^{\circ}59'19,1''$ v. d.; S, sklon 40° , podklad: dolomitické vápence; pH (H_2O): 7,21; plocha: 30 m^2 , celková pokryvnosť: 100 %, E_i : 100 %, E_o : 5 %; 27. 7. 2005; IŠ.
38. KMF, Malý Kriváň, smerom do sedla Priehyb, plochý žľab pod skalnou stienkou; 1 546 m n. m.; $49^{\circ}10'56,8''$ s. š.; $18^{\circ}59'18,0''$ v. d.; S, sklon 35° , podklad: vápence, plocha: 15 m^2 , celková pokryvnosť: 100 %, E_i : 100 %, E_o : 5 %; 24. 7. 2003; IŠ & IJ.

39. KMF, Malý Kriváň, severný svah pod hrebeňom smerom do sedla Priehyb, mierny žľab pod skalnými stienkami; 1 518 m n. m.; $49^{\circ}10'59,0''$ s. š.; $18^{\circ}59'20,7''$ v. d.; SSZ, sklon 35°, podklad: dolomitické vápence; pH (H_2O): 7,35; pH (KCl): 7,22; plocha: 30 m^2 , celková pokryvnosť: 100 %, E_i : 100 %, E_o : 5 %; 27. 7. 2005; IŠ & JŠ.
40. KMF, Malý Kriváň, žľab zvažujúci sa do záveru Belianskej doliny, pod hrebeňom smerujúcim do sedla Priehyb, rozvoľnený porast v konkávnej depresii žľabovitého charakteru, v podraste mnoho stariny, okolo rozsiahlejšie plochy s *Carex *tatrorum*; 1 527 m n. m.; $49^{\circ}10'59,5''$ s. š.; $18^{\circ}59'22,3''$ v. d.; SZ, sklon 30°, podklad: dolomitické vápence; pH (H_2O): 7,52; plocha: 18 m^2 , celková pokryvnosť: 100 %, E_i : 100 %, E_o : 3 %; 27. 7. 2005; IŠ.
41. KMF, Veľký Rozsutec, mierne konkávny žľab pod vrcholovými skalami smerujúci do Kremennej doliny; 1 575 m n. m.; $49^{\circ}13'54,4''$ s. š.; $19^{\circ}05'56,3''$ v. d.; ZSZ, sklon 30°, podklad: dolomity, plocha: 24 m^2 , celková pokryvnosť: 100 %, E_i : 100 %, E_o : 20 %; 15. 7. 2003; IŠ & JŠ.
42. KMF, Veľký Rozsutec, mierne konkávny žľab pod vrcholovými skalami, smerujúci do Kremennej doliny, nad porastami kosodreviny; 1 535 m n. m.; $49^{\circ}13'57,4''$ s. š.; $19^{\circ}06'00,7''$ v. d.; S, sklon 25°, podklad: dolomity, plocha: 20 m^2 , celková pokryvnosť: 100 %, E_i : 100 %, E_o : 50 %, machorasty neboli determinované; 15. 7. 2003; IŠ & JŠ.
43. KMF, Pekelník, mierne vhlíbený širší žľab naväzujúci na úzky, strmy žľab tesne pod hrebeňom na južnom svahu, pred samotným vrcholom, výškové maximum na Slovensku pre druhy *Clinopodium vulgare* a *Galeopsis speciosa*; 1 600 m n. m.; $49^{\circ}11'27,2''$ s. š.; $19^{\circ}01'10,7''$ v. d.; J, sklon 45°, podklad: vápence, plocha: 24 m^2 , celková pokryvnosť: 100 %, E_i : 100 %, E_o : 0 %; 23. 7. 2003; JK & JŠ, (pozri tiež Šibík et al. 2004, str. 68).
44. KMF, Malý Kriváň, východný svah nad záverom doliny Studenca, oproti kremencovému bočnému hrebienku, ktorý sa tiahne od vrcholu Malého Kriváňa, hrebienok medzi lavínovými odtrhmi, zhora chránený kosodrevinou, v podraste mnoho stariny; 1 486 m n. m.; $49^{\circ}11'07,4''$ s. š.; $19^{\circ}00'06,5''$ v. d.; VJV, sklon 30°, podklad: vápence, plocha: 20 m^2 , celková pokryvnosť: 95 %, E_i : 95 %, E_o : 1 %; 28. 7. 2005; IŠ & JŠ.
45. KMF, Chleb, hrebienok pod vrcholovými skalnými útvarmi, v ploche drobné odkryvy pôdy; 1 611 m n. m.; $49^{\circ}11'15,4''$ s. š.; $19^{\circ}03'06,8''$ v. d.; JV, sklon 30°, podklad: vápence; pH (H_2O): 7,08; pH (KCl): 6,90; plocha: 24 m^2 , celková pokryvnosť: 99 %, E_i : 99 %, E_o : 0 %; 4. 8. 2005; IŠ & JŠ.
46. KMF, Malý Kriváň, blízko žľabu oddelujúceho severozápadný a severný svah MK, nad záverom Belianskej doliny, svah pod vyústeniami početných menších žľabov medzi skalami, pravdepodobne bývalá sutina, v týchto miestach sa zhromažduje sneh a odtfhajú sa tu lavíny, v minulosti tu mohli byť sutiňové porasty, o čom svedčí prítomnosť druhu *Acetosa scutata*, porasty tvoria mozaiku so spoločenstvami so *Sesleria tatrae* a *Carex *tatrorum*; 1 536 m n. m.; $49^{\circ}10'59,9''$ s. š.; $18^{\circ}59'23,3''$ v. d.; SZ, sklon 30°, podklad: dolomitické vápence; pH (H_2O): 7,23; pH (KCl): 7,17; plocha: 15 m^2 , celková pokryvnosť: 100 %, E_i : 100 %, E_o : 15 %; 27. 7. 2005; JŠ.
47. KMF, Stratenc – Suchý, pod sedlom Vráta, balvanitý žľab zvažujúci sa do Kúrskej doliny, plocha v blízkosti veľkej skaly, svah s malou priehlbou uprostred, na zemi starina; 1 403 m n. m.; $49^{\circ}10'38,9''$ s. š.; $18^{\circ}57'54,1''$ v. d.; SZ, sklon 30°, podklad: dolomitické vápence; pH (H_2O): 6,70; pH (KCl): 6,66; plocha: 15 m^2 , celková pokryvnosť: 100 %, E_i : 99 %, E_o : 15 %; 10. 8. 2004; IŠ & JŠ.
48. KMF, Malý Kriváň, pri skalnom útvare „Sviňa“, záver žľabu pri severnom rebre; 1 493 m n. m.; $49^{\circ}11'18,9''$ s. š.; $19^{\circ}00'03,8''$ v. d.; S, sklon 40°, podklad: vápence, plocha: 24 m^2 , celková pokryvnosť: 100 %, E_i : 100 %, E_o : 60 %; 1. 8. 2002; IJ.
49. KMF, Pekelník, skalnatý komplex medzi Veľkým Kriváňom a Pekelníkom, žliabok pod vrcholovými skalkami v blízkosti hrebeňa, mimo plochy zápisu: *Delphinium elatum*; 1 565 m n. m.; $49^{\circ}11'24,7''$ s. š.; $19^{\circ}01'25,8''$ v. d.; JV, sklon 10°, podklad: vápence, plocha: 16 m^2 , celková pokryvnosť: 100 %, E_i : 100 %, E_o : 0 %; 22. 7. 2003; JŠ & JK.
50. KMF, Pekelník, skalnatý komplex medzi Veľkým Kriváňom a Pekelníkom, žliabok pod skalkami; 1 530 m n. m.; $49^{\circ}11'24,3''$ s. š.; $19^{\circ}01'27,3''$ v. d.; VJV, sklon 15 – 20°, podklad: vápence, plocha: 21 m^2 , celková pokryvnosť: 100 %, E_i : 100 %, E_o : 0 %; 22. 7. 2003; JŠ & JK.